

Зинфоро®

цефтаролина фосамил

Когда нет времени ждать

Антибиотик с быстрым ответом для стартовой терапии внебольничной пневмонии и оИКМТ у пациентов высокого риска^{1,2}



Цефалоспорины 5 поколения с быстрым и мощным антибактериальным действием^{1, 3-7}



Ранний клинический ответ и высокая частота излечения, включая тяжелых пациентов^{3, 4, 8-11}



Перекрытие ключевых возбудителей ВП и оИКМТ, включая PNSP и MRSA^{1, 5}



Профиль безопасности цефалоспоринов без дополнительных рисков, одобрен с рождения^{* 1,8-11}

* ото-, кардио-, гепатотоксичности; межлекарственных взаимодействий.

1. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Зинфоро® ЛП-001912; 2. Программа СКАТ / Под ред. С. В. Яковлева и др. – М.: Издательство «Перо», 2018. – 156 с. 3. Friedland HD, et al. Antimicrob Agents Chemother 2012;56:2231–36; 4. Eckburg PB, et al Infect Dis Clin Pract 2012;20:254–60; 5. Laudano JB. J Antimicrob Chemother 2011;66:iii11–8; 6. Garrison MW, et al. Expert Rev Anti Infect Ther 2012;10:1087–103; 7. Drusano GL. J Antimicrob Chemother 2011;66:iii61–7; 8. Corey GR, et al. Clin Infect Dis 2010;51:641–50; 9. Dryden M, et al. J Antimicrob Chemother 2016;71:3575–84; 10. Zhong NS, et al. Lancet Infect Dis 2015;16:1–71; 11. File TM, et al. Clin Infect Dis 2010;51:1395–405.

Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Зинфоро®

МНН: цефтаролина фосамил. **Фармакологические свойства:** после внутривенного введения быстро превращается в активный цефтаролин - антибиотик класса цефалоспоринов с активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. В исследованиях *in vitro* показано бактерицидное действие цефтаролина, обусловленное ингибированием синтеза клеточной стенки за счет связывания с пенициллинсвязывающими белками (ПСБ). Цефтаролин проявляет бактерицидную активность в отношении метициллин-резистентного *Staphylococcus aureus* (MRSA) и пенициллин-нечувствительного *Streptococcus pneumoniae* (PNSP) в связи с его высоким средством к измененным ПСБ этих микроорганизмов. **Показания к применению:** препарат Зинфоро® показан к применению у новорожденных, младенцев, детей, подростков и взрослых для лечения следующих инфекций: • осложненные инфекции кожи и мягких тканей; • внебольничная пневмония (включая случаи с сопутствующей бактериемией, вызванной *Streptococcus pneumoniae*). Чувствительность антибиотиков *in vitro* меняется в зависимости от географического региона и с течением времени, поэтому при выборе антибактериальной терапии необходимо учитывать местную информацию о резистентности. **Противопоказания:** • Повышенная чувствительность к цефтаролину фосамилю или L-аргинину. • Повышенная чувствительность к цефалоспорином • Тяжелые реакции повышенной чувствительности немедленного типа (например, анафилактическая реакция) на любое другое антибактериальное средство, имеющее бета-лактамина структуру (например, пенициллины или карбапенемы). **С осторожностью:** судорожный синдром в анамнезе. **Способ применения и дозы:** вводится внутривенно в виде инфузии в течение 5-60 мин или 120 мин. Продолжительность терапии должна устанавливаться в зависимости от типа и тяжести инфекции, ответа пациента на терапию. Рекомендованная дозировка препарата Зинфоро® составляет 600 мг каждые 12 часов в виде внутривенной инфузии продолжительностью 5-60 мин (стандартная доза), с соответствующим снижением дозы для пациентов детского возраста. Для лечения осложненных инфекций кожи и мягких тканей, доказано или предположительно вызванных *Staphylococcus aureus* (S. aureus) с МПК цефтаролина < 2 мг/л, дозировка препарата Зинфоро® составляет 600 мг каждые 12 часов в виде внутривенной инфузии продолжительностью 5-60 мин (стандартная доза), с соответствующим снижением дозы для пациентов детского возраста. Режим дозирования в зависимости от типа инфекции и возраста указаны в Таблицах 2 и 3 полной версии Инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Зинфоро®. **Применение у особых групп пациентов:** коррекция дозы не требуется у пациентов с печеночной недостаточностью, и у пожилых пациентов (≥ 65 лет) с КК > 50 мл/мин. Почечная недостаточность: при клиренсе креатинина ≤ 50 мл/мин требуется коррекция дозы согласно рекомендациям, указанным в полной версии Инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Зинфоро®. **Побочное действие:** очень часто: положительная прямая проба Кумбса; часто: диарея, тошнота, рвота, боль в животе, запор, головная боль, головокружение, сыпь, зуд, фибрит, брадикардия, повышение активности трансаминаз, гипергликемия, гипокальциемия, лихорадка, реакция в месте инфузии. **Передозировка:** данные о передозировке ограничены. **Лечение:** симптоматическое. Цефтаролин частично выводится с помощью гемодиализа. **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** в исследованиях *in vitro* цефтаролин не ингибировал, и не индуцировал основные изоферменты цитохрома P450, в связи с чем вероятность взаимодействия цефтаролина с препаратами, которые метаболизируются под действием изоферментов системы цитохрома P450, низка. Тесты *in vitro* не выявили антагонизма при совместном применении цефтаролина и других часто используемых антибактериальных препаратов. **Особые указания:** у пациентов с гиперчувствительностью к цефалоспорином, пенициллинам или другим бета-лактаминам антибиотикам в анамнезе, может также развиться алергическая реакция на цефтаролина фосамил. Следует принимать во внимание возможность развития колита при возникновении диареи на фоне применения цефтаролина фосамила. **Срок годности:** 3 года. **Условия отпуска:** по рецепту. **Форма выпуска:** порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 600 мг, в прозрачных стеклянных флаконах вместимостью 20 мл. Перед назначением препарата ознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению. **Регистрационный номер:** ЛП-001912 от 20.11.2012



ООО «Пфайзер Инновации»: 123112, Москва, Пресненская наб., д.10, БЦ «Башня на Набережной» (блок С) тел.: + 7 (495) 287-50-00, факс: +7 (495) 287-53-00



Служба Медицинской Информации: Medinfo.Russia@Pfizer.com. Доступ к информации о рецептурных препаратах Pfizer в России: www.pfizermedinfo.ru

PP-ZFO-RUS-0078 28.05.2021